

酸棗仁

ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN

(正品：酸棗仁；混淆品：滇棗仁)

● 正品：酸棗仁

【基原】

鼠李科Rhamnaceae植物酸棗*Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou之乾燥成熟種子。

【原植物形態】

落葉灌木，稀為小喬木，高1~3 m。樹枝灰褐色，幼枝則顯綠色，分枝基部處具刺1對，1枚針形直立，另1枚向下彎曲。葉互生，葉片卵狀披針形，長2~3.5 cm，寬0.6~1.2 cm，邊緣具細鋸齒。花小，兩性，2~3朵簇生於葉腋。核果近球形，暗紅褐色。花期6~7月，果期9~10月。

【原藥材性狀】

扁圓形或扁橢圓形，長0.5~1.0 cm，寬0.5~0.7 cm，厚約0.3 cm，表面赤褐色或紫褐色，平滑有光澤。一面平坦，中間有突起稜線或縱紋；另一面凸起，可見一端線形種臍凹陷。種皮硬脆，胚乳白色，子葉淺黃色，富油質。氣微，味淡。

● 混淆品：滇棗仁

【基原】

鼠李科Rhamnaceae植物滇刺棗*Ziziphus mauritiana* Lam.之乾燥成熟種子。

【原植物形態】

常綠喬木或灌木，高達15 m；幼枝被黃灰色密絨毛，老枝紫紅色，有2個托葉刺。葉紙質至厚紙質，卵形或矩圓狀橢圓形，稀近圓形，長2.5~6 cm，寬1.5~4.5 cm，邊緣具細鋸齒，葉面深綠色，無毛，有光澤，葉背被黃色或灰白色絨毛，基生3出脈，葉背有明顯的網脈；葉柄長5~13 mm，被灰黃色密絨毛。花綠黃色，兩性，5基数，數個密集成近無總花梗或具短總花梗的腋生二歧聚繖花序，花梗長2~4 mm，被灰黃色絨毛；萼片卵狀三角形，外面被毛；花瓣矩圓狀匙形，基部具爪；雄蕊與花瓣近等長，花盤厚，肉質，10裂，中央凹陷，子房球形，無毛，2室，每室有1胚珠，花柱2淺裂或半裂。核果矩圓形或球形，長1~1.2 cm，直徑約1 cm，橙色或紅色，成熟時變黑色，基部有宿存的萼筒；果梗長5~8 mm，被短柔毛，2室，具1或2種子；種子寬而扁，長6~7 mm，寬5~6 mm，紅褐色，有光澤。花期8~11月，果期9~12月。

【原藥材性狀】

扁圓近桃形，表面棕黃色，多有紫紅色斑紋，平坦的一面中間無明顯隆起的縱線紋。種皮較薄，切面較鬆散、易散落。

※註釋：形態及名稱混淆。

● 原植物圖片



酸棗



滇刺棗

● 藥材圖片

■ 扁橢圓形，表面紫褐色

■ 中間有突起縱線紋



酸棗仁

1 cm

■ 桃形，表面棕黃色，
多有紫紅色斑紋

■ 無明顯隆起的縱線紋



滇棗仁

1 cm